



Vacunas escolares requeridas y recomendadas - INDIANA 2018–19

Para obtener más información sobre las vacunas, visite vaccinateindiana.org

| 3 a 5 años de edad | Kínder a 4to. grado | 5to. grado | 6to. grado | 7mo. a 11vo. grado | 12vo. grado |
|---|-------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Hepatitis B (HepB) 3 | | | | | |
| Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP/DT) 4 | DTaP/DT 5 | | Tétanos y tos ferina (Tdap) 1 | | |
| Polio inactivada (IPV) 3 | IPV 4 | | | | |
| Sarampión, paperas y rubéola (MMR) 1 | MMR 2 | | | | |
| Varicela 1 | Varicela 2 | | | | |
| | Hepatitis A (HepA) 2 | HepA 2* | HepA 2 | HepA 2* | HepA 2 |
| | | | MCV4 (antimeningocócica) 1 | | MCV4 2 |
| | | | HPV (Virus del papiloma humano) 2* | HPV 2*/3* | |
| | | | | | MenB (antimeningocócica) 2* |
| Influenza anual* | | | | | |

* Vacunas recomendadas | El número debajo de la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

INDIANA 2018–19

Vacunas escolares requeridas y recomendadas



| | REQUERIDA | | RECOMENDADA |
|----------------------------|---|--|---|
| 3 a 5 años de edad | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 4 DTaP (Difteria, tétanos y tos ferina) • 3 Polio | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Varicela • 1 MMR (Sarampión, paperas y rubéola) | <ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual* |
| Kínder a 4to. grado | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio | <ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Varicela • 2 Hepatitis A | <ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual* |
| 5to. grado | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio | <ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Varicela | <ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual* • 2 Hepatitis A |
| 6to. grado | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 2 Hepatitis A • 1 MCV4 (antimeningocócica) • 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina) | <ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual* • 2 HPV (Virus del papiloma humano) |
| 7mo. a 11vo. grado | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 1 MCV4 (antimeningocócica) • 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina) | <ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual* • 2 Hepatitis A • 2/3 HPV |
| 12vo. grado | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 MMR | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 2 Hepatitis A • 2 MCV4 • 1 Tdap | <ul style="list-style-type: none"> • Influenza anual* • 2 MenB (antimeningocócica) • 2/3 HPV |

El número debajo de la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

Hep B: La edad mínima para la tercera dosis de Hepatitis B es de 24 semanas.

DTaP: 4 dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4ta. dosis se aplicó el día en que el niño cumple 4 años de edad o después.

Polio: *3 dosis de polio son aceptables para todos los grados si la tercera dosis se aplicó el día en que el niño cumple 4 años de edad o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior, y si se usó solo un tipo de vacuna (todas OPV [orales] o todas IPV [inactivas])

*Para los alumnos en Kínder a 8vo. grado, la dosis final se debe aplicar el día en que el niño cumple 4 años de edad o después, y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

Varicela: La documentación del médico sobre el historial de enfermedades, que incluya mes y año, es prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta el 10mo. grado. La información por parte de los padres sobre el historial de enfermedades es aceptable para 11vo. y 12vo. grados.

Tdap: No existe intervalo mínimo para la última dosis de Td.

MCV4: Las personas que reciben la primera dosis después de cumplir 16 años de edad solo necesitan una dosis de MCV4.

Hep A: El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendario. Se requieren 2 dosis de Hep A para Kínder a 4to. grado, 6to. y 12vo. grados.

*Para los grados 5to., y 7mo. a 11vo., se recomiendan 2 dosis de vacuna contra Hep A.



Para obtener más información sobre las vacunas, visite vaccinateindiana.org