

# Isla Vista Youth Projects Centro de Niños

## Pautas para excluir niños y personal con enfermedades

### Revisado 12/16/2020

Síntoma / Diagnóstico	¿Cuándo se excluirá al niño/personal? <small>(enviado a casa o pedido quedarse en casa)</small>	¿Cuándo puede regresar el niño/personal?	Comunicación Escolar
Tiene síntomas del COVID: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre (100.4 o mas)</li> <li>• Tos</li> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Dolor de garganta</li> <li>• Nueva pérdida de sabor/olor</li> <li>• Escalofríos</li> <li>• Dolores de cabeza o músculos</li> <li>• Náuseas / diarrea / vómitos</li> </ul>	Inmediatamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos <b>10 días</b> desde que aparecieron los primeros síntomas <b>Y</b></li> <li>• Mejora en los síntomas respiratorios (Ej., Tos, falta de aliento) <b>Y</b></li> <li>• <b>Y</b> hay fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles por al menos <b>24 horas</b></li> </ul>	
Ha estado <u>en contacto cercano</u> con alguien que tiene un caso <b>confirmado de COVID-19</b>	Inmediatamente después de aprender que, el niño (o el personal) ha tenido contacto	Después de un período de <b>cuarentena de 14 días</b> Y no se han desarrollado otros síntomas	Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido
Ha estado en <u>contacto cercano</u> con alguien que tiene alguno de los siguientes síntomas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre (100.4 o mas)</li> <li>• Tos</li> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Dolor de garganta</li> <li>• Nueva pérdida de sabor/olor</li> <li>• Escalofríos</li> <li>• Dolores de cabeza o músculos</li> <li>• Náuseas / diarrea / vómitos</li> </ul>	Inmediatamente  <i>(*) El <b>contacto cercano</b> se define como estar con una persona a menos de 6 pies de distancia durante más de 15 minutos.</i>	Después de <b>48 horas</b> después de la exposición, siempre que no presenten síntomas	
Familia/niño ha viajado internacionalmente en los últimos 14 días	A su regreso	Después de <b>14 días</b> de regreso Y no presentan síntomas	
Caso COVID-19 confirmado	Inmediatamente	Aislamiento durante al menos <b>10 días</b> desde el inicio de los síntomas, Y los síntomas mejoraron, Y no hay fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre durante al menos <b>24 horas</b>	Notificación a la comunidad escolar de un caso conocido
Prueba negativa <u>después de los síntomas</u> <small>(no para contacto cercano con alguien que tenga un caso confirmado de COVID-19)</small>		Puede regresar a la escuela después de <b>3 días</b> de mejora de los síntomas y sin fiebre durante <b>24 horas</b> sin medicamentos para reducir la fiebre	Considere la notificación a la comunidad escolar si hubo conocimiento previo de la prueba
Un proveedor médico diagnostica otra causa de síntomas		Puede regresar a la escuela si el proveedor médico proporciona una nota con instrucciones de "regreso a la escuela" siguiendo las pautas para la enfermedad específica	

Pautas para excluir a niños y personal con enfermedades (Cont.)			
Síntoma / Diagnóstico	¿Cuándo se excluirá al niño/personal? <small>(enviado a casa o pedido quedarse en casa)</small>	¿Cuándo puede regresar el niño/personal?	Comunicación Escolar
Varicela	Cuando las lesiones se notan o están presentes	Cuando <b>TODAS</b> las lesiones están secas y con costra: por lo general, dura más de 6 días	Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido
<u>Síntomas de resfriado</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nariz que moquea o congestionada</li> <li>Estornudos</li> <li>Picazón de ojos o llorosos</li> </ul> <i>Ver arriba para la tos</i>	Si va acompañado de fiebre  (ver criterios de fiebre)	Cuando se <b>resuelvan</b> los criterios de exclusión o <b>con una nota del médico</b> que indique que el niño/personal ya no es contagioso	
Diarrea	En la segunda aparición dentro de las 24 horas	Después de <b>24 horas</b> de la última aparición de diarrea y no hay otros síntomas	
Rozadura del pañal	Si las úlceras supuran y gotean líquido corporal fuera del pañal	Cuando se <b>resuelven</b> los criterios de exclusión	
<b>Fiebre</b>	<i>Consulte las pautas de Covid-19 (&gt; 100.4)</i>	<i>Mira las pautas de Covid-19</i>	
Síndrome de manos, pies y boca	Cuando las lesiones se notan o están presentes	Cuando se <b>resuelven</b> los criterios de exclusión Por lo general, lleva más de 6 días	Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido
Piojos de la cabeza	Cuando se notan o presentan liendres (huevos), ninfas (adolescentes) o adultos	Cuando se <b>resuelven</b> los criterios de exclusión (lo que significa que ninguno está visible, presente)	Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido
Irritabilidad	Si la irritabilidad no se puede redirigir y/o impide que el niño pueda participar	Cuando el niño es capaz de ser redirigida	
Comezón	Si se sospecha que la picazón es causada por alguno de los siguientes: Sarna, impétigo, tiña o cualquier cosa mencionada anteriormente	Cuando se resuelven los criterios de exclusión <b>O</b> con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso	
Letargo	Si el letargo impide la participación	Cuando se <b>resuelven</b> los criterios de exclusión	
Úlceras de boca	Cuando las úlceras causan babeo	Cuando se <b>resuelven</b> los criterios de exclusión <b>O</b> con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso	
Ojo rosado (conjuntivitis) o orzuelo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se nota la descarga</li> <li>Ojos rosados/rojos hinchados o irritados</li> </ul>	Cuando se <b>resuelven</b> los criterios de exclusión <b>O</b> después de <b>48 horas</b> de antibióticos <b>O</b> al menos <b>5 días</b> de aislamiento en el hogar han pasado y no hay signos visibles de infección	
Sarpullido o erupción	Cuando se nota una erupción no identificada y se acompaña de: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio de comportamiento</li> <li>Fiebre</li> <li>Tiene supuración/herida abierta</li> <li>El niño no puede participar</li> </ul>	Cuando se resuelven los criterios de exclusión o con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso	
Faringitis estreptocócica	Si el niño tiene una cultura positiva de estreptococos	Después de al menos <b>48 horas</b> de antibióticos.	
Vómito	En la segunda aparición dentro de las 24 horas	Después de <b>24 horas</b> sin más vómitos y sin otros síntomas	

El Director del Centro de Niños de IVYP (o "director interino") se reserva el derecho de excluir / incluir a los niños / personal cuando lo consideren conveniente o lo consideren necesario. Tenga en cuenta que se recomienda que mantenga a su hijo en casa si lo considera necesario o apropiado.