



You Never Know What You're Truly Getting in ANY Drug!

Illicitly Manufactured Fentanyl (IMF) is a synthetic opioid 50-100 times stronger than morphine and is the leading cause of fatal overdoses in Connecticut.

Laboratory testing of drugs seized by law enforcement shows that IMF can be mixed into any substance. Since you can't see, taste, or smell IMF there is no way to know if it is present in the substance you are using. It is important to understand the dangers of fentanyl and be prepared whenever you are using a substance by knowing how to use Fentanyl Test Strips, understanding the signs of an overdose, never using alone, and always having naloxone on hand.

Fentanyl Test Strips

How they work:

1. Dissolve a small amount of substance in water.
2. Dip the test strip into the liquid for 15 seconds.

Although the tests are highly sensitive, it is possible that fentanyl is present in another part of the substance that wasn't tested.

To obtain fentanyl test strips and naloxone contact:

- Liberation Programs – 855.542.7764
- Stamford CARES – 203.977.5296

Signs of Overdose

- Small, constricted "pinpoint pupils"
- Falling asleep/loss of consciousness/limp body
- Shallow or slow breathing
- Pale, blue, or ashen-colored skin
- Choking or gurgling sounds



How to Respond to an Overdose

- 1** Call 911 immediately!
- 2** Support the person's breathing.
- 3** Administer naloxone (Narcan).
- 4** Stay with the person until the ambulance arrives.



For additional resources, visit YouThinkYouKnowCT.org





¡Nunca Sabe de Verdad Lo que CUALQUIER Droga Contiene!

El fentanilo fabricado ilícitamente (IMF por sus siglas en inglés) es un opioide sintético 50-100 veces más potente que la morfina y es la primera causa de muerte de las sobredosis fatales en Connecticut.

Las pruebas en laboratorio de la drogas incautadas por los cuerpos policiales demuestran que se puede mezclar el IMF en cualquier sustancia. Como no se puede ver, ni saborear ni oler el IMF no hay ninguna manera de saber si está presente en la sustancia que usted está usando. Es importante entender los peligros del fentanilo y ser preparado cuando sea que está usando una sustancia al saber cómo usar las Pruebas de Tira Reactiva al Fentanilo, entender las indicaciones de una sobredosis, nunca usar a solas, y siempre tener naloxona disponible.

Tiras Reactivas al Fentanilo: Cómo funcionan

1. Disuelva una pequeña cantidad de la sustancia en agua.
2. Moje la tira reactiva en el líquido por 15 segundos.

Aunque la pruebas son muy sensibles, es posible que el fentanilo esté presente en otra parte de la sustancia a la cual no hicieron la prueba.

Para obtener tiras reactivas de fentanilo y contacto con naloxona:

- Liberation Programs – 855.542.7764
- Stamford CARES – 203.977.5296

Indicaciones de una sobredosis

- Las "pupilas puntiformes", pequeñas y contraídas
- Dormirse/Pérdida de la conciencia/cuerpo flácido
- Respiración poca profunda o lenta
- Color de piel ceniciento, pálido o azul
- Ahogo o ruido de gorgoteo

Las apariencias engañan



Cómo Responder a Una Sobredosis

1

¡Llame al 911 de inmediato!

2

Adminístrele naloxona (Narcan).

3

Apoya la respiración de la persona.

4

Quédese con la persona hasta que llegue la ambulancia.



Traducción financiada por
Stamford Youth Services



Para obtener más recursos, visite a
YouThinkYouKnowCT.org