

Contre-indications du Paxlovid

- Avec les médicaments **qui dépendent fortement du CYP3A pour leur clairance et pour lesquels des concentrations élevées sont associées à des effets graves** et/ou mettant en jeu le pronostic vital
 - Antagoniste des alpha1-adrénorécepteurs : alfuzosine.
 - Analgésiques : péthidine, piroxicam, propoxyphène.
 - Antiangineux : ranolazine- Antiarythmique : amiodarone, dronedarone, flécaïnide, propafénone, quinidine
 - Anti-goutte : colchicine
 - Antipsychotiques : lurasidone, pimozide, clozapine.
 - Dérivés de l'ergot : dihydroergotamine, ergotamine, méthylergonovine.
 - Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase : lovastatine, simvastatine.
 - Inhibiteur de la PDE5 : sildénafil (Revatio®) en cas d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).
 - Sédatifs/hypnotiques : triazolam, midazolam oral.
- Avec les **médicaments qui sont de puissants inducteurs du CYP3A**, Lorsqu'ils sont significativement réduits, nirmatrelvir ou ritonavir peuvent être associées à un **risque de perte de réponse virologique et à une éventuelle résistance.**
- **PAXLOVID ne peut pas être commencé immédiatement après l'arrêt de l'un des médicaments suivants en raison de l'effet retardé de l'inducteur du CYP3A récemment arrêté.**
 - Médicaments anticancéreux : apalutamide
 - Anticonvulsivants : carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne.
 - Antimycobactériens : rifampine
 - Produits à base de plantes : Millepertuis (hypericum perforatum)