

# DIABETES

## CONCIENCIA DEL RIESGO



# AUDIENCIA

## DECISIONES DE SALUD

EN LOS ESTADOS UNIDOS, SE ESTIMA QUE **34 MILLONES** DE PERSONAS TIENEN **DIABETES** Y **7,3 MILLONES** AÚN NO HAN SIDO DIAGNOSTICADAS.<sup>[1]</sup>




### ¿SABÍA?

La pérdida de audición ocurre con casi el **doble** de frecuencia en adultos que tienen **diabetes** que en aquellos que no la tienen.<sup>[2]</sup>



### ¿POSIBLES CAUSAS?

Estudios indican que los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos y los nervios del oído interno, lo que reduce la capacidad de oír bien.<sup>[3]</sup>




**HABLE CON SU DOCTOR :** ¿Tiene diabetes o antecedentes familiares que puedan aumentar su riesgo de pérdida auditiva relacionada con la diabetes? ¡NUESTROS CONSEJOS PUEDEN AYUDAR!

#### OBTENGA EVALUACIONES ANUALES PARA DESCUBRIR:

- Si tiene pérdida auditiva o está en riesgo.
- El tipo de pérdida auditiva que pueda tener.
- Cómo su salud auditiva y su calidad de vida
- puede ser mejorado.

Para más información, visite: [www.diabetes.org](http://www.diabetes.org)

#### PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DEFICIENCIA AUDITIVA LEVE O MAYOR



Discapacidad auditiva leve o mayor en sonidos de **baja o media frecuencia** en el peor oído

**Hometown**  
PRIMARY CARE

555.456.7890  
[hometownhearing.com](http://hometownhearing.com)

© 2020 HEALTHSCAPES®

[1] National Diabetes Statistics Report, U.S. Department of Health and Human Services., 2020 [2] Hearing Loss is Common in People with Diabetes, U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, NIDDK, NIDCD, 2008. [3] Cruickshanks, *et al*: Smoking, central adiposity, and poor glycemic control increase risk of hearing impairment. *Journal of the American Geriatrics Society* 2015